

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 17-3-66 483889

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE L'ILE DE FRANCE

(SEINE, SEINE-&-OISE, SEINE-&-MARNE, EURE-&-LOIR, EURE, OISE)

ABONNEMENT ANNUEL
15 F

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 47 Av. Paul-Doumer, MONTREUIL-s-BOIS (Seine) - AVR 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

15 MARS 1966

BULLETIN N° 66
Supplément n° 1

AVERTISSEMENTS

CULTURES FRUITIÈRES

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Le nombre des périthèces mûrs augmente sensiblement. Un nouveau traitement devra donc être appliqué :

- Sur poirier : variétés à floraison précoce, avant floraison;
variétés à floraison plus tardive, dès le stade D3.

Dans les secteurs froids les variétés les plus tardives ont été traitées récemment ou le seront dès l'apparition du stade C3-D.

- Sur pommier : pratiquement seules les variétés très hâtives ont été déjà traitées; intervenir dès le stade E2. Pour les autres variétés effectuer un traitement à partir du stade C3-D.

INFORMATIONS

DIVERS

- ANTHONOME DU POMMIER : Maintenir la protection. De grosses émergences s'étant produites depuis le 6, des pontes importantes sont à craindre à partir du 20. Tout traitement est inutile après le Stade D.
- CECIDOMYIE DES POIRETTES : Le vol est pratiquement terminé. Ne plus intervenir après le stade E2.
- PUCERONS : Nouveaux foyers de P. noir du pêcher. Eclosions de P. vert du pommier.
- ACARIENS : Le Bryobe peut être dangereux avant floraison.
- OIDIUM DU POMMIER : Les premiers germes ont été observés sur bourgeons contaminés l'année dernière. Effectuer un traitement sur les variétés déjà débourrées et pour les autres dès le débourrement.
- MONILIA DU PRUNIER ET DU CERISIER : Intervenir sur le prunier dès que la majorité des boutons a atteint ou dépassé le stade dégagement des fleurs dans les inflorescences, sur le cerisier dès l'apparition des pétales dans les boutons se dégageant. Employer un produit cuprique (250 g. de cuivre métal par hl.) ou un organique de synthèse.

MELIGETHES DU COLZA

GRANDES CULTURES

Les premiers Meligèthes sont apparus. Ils sont encore rares mais peuvent déjà causer des dégâts en s'attaquant au bouton floral avant qu'il ne se dégage des feuilles du sommet. Bien surveiller les cultures.

L'Ingénieur et l'Agent Technique
chargés des Avertissements Agricoles,
H. SIMON et R. MERLING.

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux,
G. BERGER.

Imprimerie de la Station de l'Ile-de-France - Directeur-Gérant : L. Bouyx.
47, Avenue Paul Doumer - 93 - Montreuil s/s Bois

P128